

## КЛІНІКА СУДИННИХ ІННОВАЦІЙ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТИНА ВЕРІТАС»

ЄДРПОУ: 39405752, м.Київ, вул. Ак.Вільямса, б.4,  
IBAN UA123226690000026002300890212 AT «Ощадбанк»  
+380965988289

Вих. № 19  
від 25.09.2024р.

### **Медична Довідка** **Видана: Новицькому Віктору Володимировичу**

Після клінічного обстеження у клініці отримав призначення стосовно лікування наявної хвороби.

Діагноз: Цукровий діабет 2 типу. Артеріальна гіпертензія 2-ї стадії. Дисциркуляторна енцефалопатія 2-ї стадії змішаного генезу. Дегенеративно-дистрофічні зміни хребта та суглобів.

Рекомендовано щоденний прийом за індивідуально підбраною ангіотерапевтичною схемою з метою профілактики критичних станів та інсульту протягом 3-ьох місяців в амбулаторному режимі в ампулах та таблетованих формах для постійної корекції ангіотонусу та нейродинамічних дисбалансів, корекції артеріального тиску та підтримання адекватного рівня мозкового постачання за авторськими технологіями індивідуальної ангіокорекції на доказовій основі.

Для транспортування будь-якими видами транспорту тара медикаментів – в ампулах, флаконах та таблетках. Тара при транспортуванні не змінюється з метою уникнення окислення та хімічної реакції, що призведе до псування медикаментозних сумішей.

Видані наступні медикаменти: Натрію адезинотрифосфат, Ксантінол нікотинат, Нейроксон, Ніотинова кислота, Сульфокамфокаїн, Актовегін, Кофеїн, Тіоцетам, Армадін, Інгаліпт, Валідол-Дарниця, Евказолін Аква, Лоперамід, Трикардин, Мілі Носік, Розторопші, Корвалол-Дарниця, Хіло-Кеа, Трифас Сог, Амоксил-К 625, Спазмалгон, Натрію хлорид, Фуросемід-Дарниця, Рицинова олія, Валеріана, Омепразол.

Видані шприци для ін'єкцій: 20мл та 50мл.

Медичний директор

У.Б.Лущик



# Clinic of Vascular Innovations

## IstynaVeritas Limited Liability Company

39405752. Ukraine, Kyiv, Wilms Academic Street 4  
+380965988289

---

№ 19  
to 25.09.2024

### **Medical Reference given to Viktor Novytskyy**

After a clinical examination at the clinic, he received a prescription for the treatment of his existing disease.

Diagnosis: Type 2 diabetes mellitus. Arterial hypertension on the 2nd stage. Disseminated encephalopathy of the 2nd stage of mixed genesis. Degenerative-dystrophic changes of the spine and joints.

It is recommended to take individually selected angiotherapeutic mixtures for the prevention of critical conditions and stroke for 3 months on an outpatient basis in ampoules and tablet forms for continuous correction of angiotension and neurodynamic imbalances, correction of blood pressure and maintenance of an adequate level of cerebral supply applying the author's technologies of individual angiocorrection on an evidence-based basis.

The containers for medicines are in ampoules, vials and tablets for transportation by any means of transport. Do not change the container during transportation and further use in order to avoid oxidation and chemical reaction, which will lead to the deterioration of medicinal mixtures.

The following medicines are delivered: Sodium adenosine triphosphate, Xanthine nicotinate, Neuroxone, Nicotinic acid, Sulfocamphocaine, Actovegin, Caffeine, Thiocetam, Armadine, Ingalipt, Validol-Darnitsa, Eucazoline Aqua, Loperamide, Tricardine, Mili Nose, Milk Thistle, Corvalol-Darnitsa, Hilo-Kea, Triphas Cor, Amoxil-K 625, Spasmalgon, Sodium chloride, Furosemide-Darnitsa, Castor oil, Valerian, Omeprazole. Syringes for injections were issued: 20ml and 50ml.

Medical Director



U.B. Lushchyk

